

AKUT SMÄRTA

Smärtutbildning för AquaDentals tandläkare. För att kunna handlägga patientens smärtproblematik på bästa sätt och ställa rätt smärtdiagnos behöver vi kunskap om hur patientens smärtaska utredas. Vi hoppas att denna utbildning kan ge dig ökad förståelse och kunskap kring akut smärta inom odontologin.

- 18.00-18.30 Drop-in, Karo Pharma bjuder på lättare middag
- 18.30-19.45 Smärtutbildning Akut smärta i tandvården, Reza Parsa, Specialist i Käkkirurgi
- 19.45-20.00 Produktinformation Dolerin
- 20.00-20.15 Om Flux och nyhet från Flux. Produktprov tillhandahålls
- 20.15 Vi avrundar kvällen och finns kvar för frågestund

FLUX **Dolerin**[®]
paracetamol 500mg / ibuprofen 150mg

BEGRÄNSAT
ANTAL PLATSER!

TID OCH PLATS

Datum 27 maj, 28 maj
Plats Karo Pharma huvudkontor,
Klara Norra Kyrkogata 33,
Stockholm

Karo Pharma står för föreläsararvode,
lokal och förtäring.

ANMÄLAN

Anmäl dig här:
<http://karopharma.se/akademi>

OBSERVERA - Anmälan är bindande!
Avbokning sker 48 timmar innan.
Avbokning sker via mejl till
akademi@karopharma.se

Sista anmälningsdag är 15 maj 2020.

Frågor och funderingar? Kontakta
oss på akademi@karopharma.se

Välkommen!

**KARO
PHARMA**

Dolerin® filmtragerad tablett innehåller 500 mg paracetamol och 150 mg ibuprofen. Rx, 30 fp EF, 50 fp F, ATC-kod N02BE51. Vanlig dos av Dolerin är 1-2 tabletter var 6:e timme vid behov, vilket ger en maximal dygnsdos av paracetamol och ibuprofen på 4000 mg respektive 1200 mg. Indikation: Dolerin är indicerat för tillfällig lindring av akut smärta förknippad med: huvudvärk (ej migrän), ryggvärk, tandvärk, muskelvärk och halsont. Dolerin är indicerat för feber. Rekommenderas inte till barn under 18 år. Patienten bör kontakta läkare om symptomen kvarstår i mer än 3 dagar eller förvärras, eller om produkten krävs i mer än 3 dagar. Varningar och försiktighet: Biverkningar kan eventuellt minimeras genom att använda den lägsta effektiva dosen under kortast möjliga tid, som krävs för att kontrollera symtomen. Dolerin ska inte användas tillsammans med andra NSAID preparat pga. ökad risk för allvarliga gastrointestinala blödningar. Dolerin ska inte användas tillsammans med andra läkemedel som innehåller paracetamol pga. ökad risk för allvarlig leverskada. Behandling med Dolerin ska avslutas vid första tecken och symtom på allvarliga hudreaktioner, såsom hudutslag, sår på slemhinnor eller något annat tecken på överkänslighet. Dolerin ska ej ges under de tre sista månaderna av graviditeten, till patienter med aktiv alkoholism, patienter med svår leversvikt eller svår njursvikt, patienter med hjärnblödning, annan aktiv blödning, ökad blödningsbenägenhet eller blodkoagulationsstörningar, patienter med svår hjärtsvikt, eller till patienter med överkänslighet mot ingående substanser eller andra NSAID-preparat.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Produktresumé uppdaterad 2020-02-25. Karo Pharma AB, Box 16184, 103 24 Stockholm.